Dispositio generum palaearcticorum divisionis **Capsaria** familiae **Capsidae**.

Scripsit

O. M. Reuter.

1. (36). Corpus superne, capite excepto, cum hemielytris [1]) punctatum vel punctulatum, scutello tamen saepe laevi, pronoto rarissime remotissime punctato, in hoc casu clavo corioque versus basin sat fortiter punctatis cuneoque latitudine basali breviore. Vertex plerumque marginatus. Corpus interdum tomento denso tectum, punctura tamen, tomento divulso, distincta; pronotum interdum dense profunde strigosum.

2. (3). Membrana pilis adpressis pubescens. Hemielytra feminae saepe valde abbreviata, membrana destituta. Caput breve, pone oculos tumidos constrictum. Pronotum fortiter impresso-punctatum, callis transversis, confluentibus, nitidis, depressis, marginibus eorum valde impressis. Scutellum carina longitudinali magis minusve distincta. Tarsi postici articulo primo secundo sat multo longiore. Corpus longe pilosum.

1. **Bothynotus** Fieb.

3. (2). Membrana glabra.

4. (5). Scutellum in cristam altam compressam postice sinuatam elevatum. Caput breve, pone oculos constrictum. Pronotum fortiter impresso-punctatum, callis parvis, disjunctis, apice in stricturam magnam collariformem

---

[1]) Hemielytra generis *Stethoconus* laevia.

constrictum. Tarsi postici articulo primo secundo distincte longiore. Hemielytra laevia, lateribus dilatatis. Corpus longe pilosum.

2. **Stethoconus** Fieb.

5. (4). Scutellum haud in cristam alte elevatum, saepe tamen magis minusve convexum.

6. (7). Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul sumtis aeqve longo. Antennae articulis ultimis brevibus. Vertex marginatus. Corpus superne impresso-punctatum, cum antennis et pedibus molliter pilosum.

3. **Alloeotomus** Fieb.

7. (6). Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul sumtis distincte, plerumqve multo breviore.

8. (9). Corpus superne tomento denso fulvicanti tectum. Pronotum dense profunde transversim strigoso-punctatum vel strigulosum, sub-horizontale. Vertex latus, maris distincte marginatus. Caput a latere visum altitudine brevius, clypeo cum fronte confluente, genis altis, a supero visum pronoto circiter $^1/_3$—$^1/_4$ angustius. Hemielytra feminae abbreviata. Color niger.

4. **Irbisia** Reut.[1])

9. (8). Pronotum punctatum vel punctulatum, raro profunde transversim rugosum, in hoc casu color virescens.

10. (19). Vertex solum lateribus tenuiter vel obsolete marginatus, saepe totus immarginatus. Corpus numqvam unicoloriter virescens.

11. (12). Caput crassum, dimidio basali pronoti distincte latius. Genae altae. Oculi versus apicem fortiter divergentes, orbita interiore subrecta. Pronotum basi truncatum, ipsis angulis rotundatis. Tarsi postici articulo primo secundo parum longiore.

5. **Capsus** Fabr.

---

[1]) = *Thyrillus* Uhler, sec. spec.

12. (11). Caput pronoto circiter duplo vel magis qvam duplo angustius.

13. (14). Clypeus vix prominens. Caput verticale, basi pronoti circiter duplo angustius, ab antico visum latitudine cum oculis vix brevius. Vertex deplanatus, angustus. Antennae articulo primo apicem clypei parum superante, ultimis simul sumtis secundo longioribus. Pronotum fortiter impresso-punctatum. Tarsi articulis duobus primis longitudine subaeqvalibus.

6. **Saundersiella** Reut.

14. (13). Clypeus magis minusve prominens. Caput nutans, plerumque dimidio basali pronoti angustius.

15. (18). Pronotum fortiter impresso-punctatum. Hemielytra fortiter punctata. Tarsi postici plerumque (excepto *Camptobrochi punctulato*) margine inferiore articuli primi eodem margine secundi distincte longiore. Antennae articulis duobus ultimis simul sumtis secundo plerumque brevioribus.

16. (17). Antennae articulo primo apicem clypei longius superante. Clypeus fortiter prominens. Pronotum basi qvam apice fere triplo latius. Oculi laeves. Ungviculi plerumque basi dentati.

7. **Deraeocoris** Stål.

17. (16). Antennae articulo primo apicem clypei haud vel paullo superante. Caput breve, transversum. Membrana vena brachiali fortiter arcuata.

8. **Camptobrochis** Fieb.

18. (15). Pronotum remote sat obsolete punctatum. Hemielytra punctulata. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eidem margini primi aeque longo. Antennae articulis duobus ultimis simul sumtis secundo longioribus.

9. **Liocoris** Fieb.

19. (10). Vertex postice totus marginatus, margine carinato interdum medio tenuiore, rarissime solum lateribus linea tenui transversa impressa, in hoc casu corpus virescens, unicolor.

20. (25). Corpus superne et inferne pilis fragilibus faciliter divellendis aureis, orichalceis, argenteis vel albis tomentosum.

21. (22). Corpus alte convexum, superne fortiter impresso-punctatum. Gula brevis. Pronotum strictura apicali crassa. Orificia metastethii bene distincta. Tarsi postici articulis duobus primis aeque longis.

10. **Charagochilus** Fieb.

22. (21). Pronotum et hemielytra subtilius punctata. Gula modice longa. Pronotum strictura apicali sat tenui. Orificia metastethii aegre distingvenda, rimam tenuem formantia. Tarsi postici articulo secundo primo distincte longiore.

23. (24). Clypeus minus prominens. Pronotum totum nigrum, basi longitudine parum magis qvam dimidio latius. Hemielytra feminae fortius rotundato-ampliata, etiam maris lateribus arcuata, cuneo latitudine basali haud vel parum longiore.

11. **Polymerus** Hahn.

24. (23). Clypeus fortius prominens. Pronotum saltem limbo basali pallido. Hemielytra maris lateribus parallelis et cuneo latitudine basali plerumque distincte longiore.

12. **Poeciloscytus** Fieb.

25. (20). Corpus saltem inferne pilis fragilibus facile divellendis aureis, orichalceis, argenteis vel albis destitutum, tenuiter pubescens vel subglabrum.

26. (35). Tarsi postici articulo secundo saltem margine inferiore primo parum vel vix longiore, tertio secundo longiore, saepe multo longiore. Oculi in genas minus longe extensi.

27. (28). Femora postica reliquis multo crassiora et longiora. Caput a latere visum altum, altitudine fere duplo brevius. Vertex aequaliter marginatus. Genae praecipue feminae altae. Antennae articulo secundo latitudine capitis multo longiore. Hemielytra lateribus rotundata. Cuneus fortiter declivis.

13. **Cyphodema** Fieb.

28. (27). Femora postica anticis parum vel paullo longiora et paullo vel vix crassiora. Caput a latere visum minus altum, altitudine saltem minus qvam duplo brevius. Cuneus sat leviter declivis.

29. (30). Antennae distincte infra apicem oculorum interne insertae. Caput basi pronoti paullo magis qvam $^{1}/_{3}$ angustius, ab antico visum vix transversum. Vertex aequaliter marginatus. Pronotum strictura apicali opaca. Orificia metastethii haud conspicua.

14. **Zygimus** Fieb.

30. (29). Antennae mox supra apicem oculorum interne insertae. Pronotum strictura apicali glabra, nitida. Orificia metastethii distincta.

31. (32). Pronotum inter callos usque ad stricturam apicalem impresso-punctatum. Caput basi pronoti solum circiter $^{1}/_{3}$ angustius. Vertex medio multo tenius marginatus. Antennae articulo primo apicem clypei attingente. Cuneus latitudine basali parum longior.

15. **Camptozygum** Reut. n. g. [1])

32. (31). Pronotum inter callos antice laeve et convexum. Vertex aequaliter marginatus. Antennae articulo primo apicem clypei superante. Cuneus elongato-triangularis.

33. (34). Caput ab antico visum sat fortiter trans-

---

[1]) Typus: *Phytocoris pinastri* Fall.

versum, basi pronoti fere duplo angustius. Gula vix distinguenda. Pronotum profunde punctatum.

16. **Lygidea** Reut.

34. (33). Caput ab antico visum fere aeque longum ac latum. Gula distincta, in plano peristomii posita. Pronotum profunde rugosum, callis antice in tylum laevem confluentibus.

17. **Plesiocoris** Fieb.

35. (26). Tarsi postici articulo secundo primo distincte longiore, tertio secundo longitudine aequali vel hoc fere breviore. Vertex haud latus, saepe angustus. Oculi in genas longius extensi, parte superiore orbitae interioris plerumque parum divergentes, dein subito magis minusve fortiter saepe profunde sinuati. Gula vix distinguenda vel distincte obliqua. Orificia metastethii distincta.

18. **Lygus** Fieb., Reut.

36. (1). Corpus superne inpunctatum, laeve, solum pronoto interdum ruguloso, raro punctulato vel punctato. Hemielytra laevia vel obsolete punctulata. Vertex immarginatus vel solum ad oculos obtuse breviter marginatus. Cuneus plerumque latitudine basali longior.

37. (38). Vertex utrinque ad oculum breviter obtuse et obsolete marginatus, medio late immarginatus. Antennae graciles, articulo primo apicem capitis haud superante, secundo lineari. Tarsi postici articulo tertio duobus primis simul sumtis saltem aeque longo.

19. **Dichrooscytus** Fieb.

38. (37). Vertex totus immarginatus. Antennae articulo primo apicem capitis plerumque superante.

39. (88). Vertex raro [1]) sulco tenui longitudinali instructus, in hoc casu pronotum lateribus immarginatis vel

---

[1]) *Epimecellus, Adelphocoris, Megacoelum, Pantiliodes, Ischnoscelicoris.*

caput verticale vel fortiter nutans, fronte apicem versus plerumque fortiter declivi.

40. (87). Pronotum sulco transversali latera superante destitutum, rarissime sulco in latera producto, in hoc casu [1] antennae articulo secundo clavato.

41. (86). Genae humiles vel mediocres, raro altae, in hoc casu pronotum lateribus totis obtusis vel solum extremo apice pone stricturam marginatis vel caput nutans, latitudine postica sat multo longius.

42. (85). Lorae haud vel raro buccato-arcuatae, in hoc casu genae humiles vel mediocres.

43. (80). Femora postica apicem abdominis haud vel rarissime [2] superantia, linearia vel subcylindrica, solum apice paullo attenuata, nec compresso-dilatata versus apicem sensim fortius acuminata et compressa. Antennae articulo primo pronoto distincte breviore, rarissime [3] huic aeque longo.

44. (47). Tarsi postici articulo primo secundo duplo longiore. Rostrum coxas posticas superans.

45. (46). Tarsi postici articulo primo secundo haud crassiore. Corpus subelongatum, superne parum convexum. Caput a latere visum altitudinem latitudine clypei superans, genis humilibus. Antennae in tertia apicali parte orbitae oculorum interioris insertae. Orificia metastethii parva.

20. **Stenotus** Jak.

46. (45). Tarsi postici articulo primo reliquis multo crassiore. Corpus oblongo-ovale, sat robustum. Genae altae. Antennae ad apicem oculorum interne insertae, articulo primo robusto apicem clypei paullo vel parum supe-

---

[1] *Epimecellus*, forsitan etiam *Gryllocoris* forma macropt. (hactenus ignota).

[2] *Calocoris sulphureus*, cujus articulus antennarum primus pronoto brevior.

[3] *Calocoris princeps*, cujus articulus secundus antennarum apice clavatus. *Ischnoscelicoris* ♀ brachyptera.

rante, secundo apicem versus sensim crassiore. Orificia metastethii magna.

21. **Pachypterna** Fieb.

47. (44). Tarsi postici articulo primo secundo breviore vel huic aeque longo, rarissime hoc distincte longiore, in hoc casu rostrum coxas intermedias haud vel parum, posticas numqvam superans.

48. (49). Membrana areola majore apice late rotundata. Cuneus (saltem ♀) latitudine basali vix longior. Antennae articulis duobus primis crassis, secundo (♀) clavato. Pronotum strictura apicali articulo primo antennarum aeque crassa lateribus angustiore.

22. **Eurycyrtus** Reut.

49. (48). Membrana (formae macropterae) areola majore apice angulata vel angulato-rotundata, rarissime [1]) sat obtuse rotundata, in hoc casu antennae articulis linearibus pronotumque strictura apicali tenui.

50 (51). Rostrum medium mesosterni haud superans, rarissime [2]) apicem mesosterni subattingens. Frons apice supra basin clypei tumido-prominens. Clypeus verticalis. Antennae articulis duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus. Strictura apicalis pronoti lata. Corpus superne pilosum. Segmentum maris genitale muticum, inferne pilosum.

23. **Brachycoleus** Fieb.

51. (50). Rostrum medium mesosterni superans.

52. (55). Corium inter venas brachialem et cubitalem vena distincte elevata intermedia longitudinali instructum, cubitali apice furcata. Tarsi postici articulo primo secundo paullo crassiore, apice profunde exciso, margine inferiore eodem secundi distincte longiore. Coxae anticae breves. Tibiae breviter spinulosae. Antennae ad vel mox supra

[1]) *Megacoelum.*
[2]) *Br. lineellus*

apicem oculorum interne insertae. Pronotum margine laterali apicem versus acuto vel acutiusculo.

53. (54). Corpus ovatum. Caput ab antico visum latitudini aeque longum. Clypeus fortiter prominens, basi a fronte sat bene discretus. Oculi pronoto contigui, prominentes. Rostrum coxas intermedias paullo superans, articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti haud vel parum longiore. Pronotum latitudini basali saltem $^1/_4$ brevius. Pedes breviusculi.

24. **Actinonotus** Reut. n. gen. [1])

54. (53). Corpus subelongatum. Caput ab antico visum latitudine sat multo longius, fronte et clypeo in arcum latum confluentibus. Oculi a pronoto paullo remoti. Rostrum coxas intermedias attingens vel subattingens, articulo primo basin capitis vix attingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti longiore. Pronotum latitudine basali vix vel paullulum brevius, utrinque ad angulum posticum impressione obtusa.

25. **Pycnopterna** Fieb.

55. (52). Corium solum venis brachiali et cubital discretis.

56. (77). Vertex rarius [2]) linea media longitudinali impressa, in hoc casu caput verticale vel fortiter nutans, a latere visum altitudine basali brevius, clypeo parum vel haud prominente, cum fronte subconfluente vel ab ea leviter discreto.

58. (57). Hemielytra (formae hactenus cognitae) utriusque sexus abbreviata, membrana destituta, apice versus commisuram fortiter oblique truncata. Corpus elongato-obovatum, argenteo-pubescens, superne nigro-pilosum. Caput fortiter nutans, ab antico visum latitudine multo longius, fronte et clypeo in arcum latum confluentibus. Genae altae.

---

[1]) Typus: *Capsus pulcher* H. Sch.

[2]) *Epimecellus. Adelphocoris, Megacoelum.*

Antennae mox infra apicem oculorum insertae, articulo primo capite ab antico viso magis qvam duplo breviore, secundo apice clavato. Pronotum (formae hactenus cognitae) latitudine basali multo longius, lateribus obtusis, medio late rotundatis, strictura apicali lata solum lateribus distinctiore callis haud discretis.

26. **Aphanosoma** Costa.[1]

58. (57). Hemielytra explicata, raro[2] feminae abbreviata, in hoc casu tamen membrana brevissima instructa et antennae totae graciles.

59. (72). Pronotum strictura apicali lata, ipse basi articuli secundi antennarum latiore, raro huic aeque lata, in hoc casu caput a latere visum altitudini saltem aeque longum vel clypeus prominens a fronte bene discretus vel antennae articulis duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus.

60. (63). Pronotum callis magnis horizontalibus a supero visis usque in margines laterales extensis, disco postico versus callos declivi. Caput ab antico visum latitudine longius. Clypeus leviter vel parum prominens. Antennae ad apicem oculorum interne insertae, articulo primo capite ab antico viso circiter duplo breviore.

61. (62). Tarsi postici articulis aeque crassis, secundo primo longiore, margine libero inferiore eidem primi aeque longo, tertio duobus primis simul sumtis fere aeque longo. Corpus anguste elongatum. Caput fronte et clypeo arcum latum formantibus, clypeo parum prominente, basi impressione a fronte leviter discreto. Antennae articulo secundo apice clavato, latitudine basali pronoti duplo longiore. Pronotum lateribus antice ad callos marginatis, medio fortiter sinuatis.

27. **Epimecellus** Reut.

[1] *Aphanosoma* Costa 1849 = *Gryllocoris* Baer. 1859.

[2] *Alloeonotus*.

62. (61). Tarsi postici articulo primo secundo paullo crassiore, apice superne profunde exciso, margine inferiore eodem secundi sat multo longiore. Corpus oblongo-ovale. Caput fronte sensim declivi, clypeo leviter prominente, basi a fronte sat leviter discreto. Pronotum lateribus obtusis.

28. **Homodemus** Fieb., Reut.

63. (60). Pronotum rarissime [1]) callis usque in latera extensis, in hoc casu pronotum campanuliforme, lateribus sinuatum, tarsique postici articulo primo secundo multo breviore. Tarsi postici articulo primo raro margine inferiore eodem secundi longiore, plerumque huic margini aeque longo vel hoc breviore.

64. (69). Oculi basi ab apice pronoti distincte magis minusve distantes. Corpus subelongatum vel oblongum. Antennae articulo secundo margine basali pronoti sat multo longiore. Pronotum latitudine basali plerumque vix vel paullulum brevius.

65. (66). Caput a latere visum altitudini aeque longum. Clypeus fortiter prominens. Genae altae. Antennae articulo secundo versus apicem vix vel levissime incrassato. Corpus nigrum, flavo- vel rubro-signatum.

29. **Grypocoris** Dougl. et Sc. [2])

66. (65). Caput a latere visum altitudine longius, gula leviter obliqua vel subhorizontali. Frons apice excepto subhorizontalis. Corpus elongatum.

67. (68). Angulus facialis acutus. Antennae graciles, articulo primo elongato, scuundo lineari. Pronotum basi truncatum vel sinuatum, basin scutelli haud obtegens. Genae altae. Tarsi postici margine inferiore articuli primi eodem

---

[1]) *Alloeonotus.*

[2]) Hujus generis species sunt: *Gr. Fieberi* D. et Sc. (= *Pycnopterna blanda* Put.), *Homodemus Meyeri* Kol., *Deraeocoris amoenus* Dougl. et Sc., *Gr. Noualhieri* m. (= *Homodemus marginellus var. β* Fieb.!) et *Gr. syriacus* n. sp.

secundi breviore. Margines exteriores acetabulorum anticorum prominentes, a supero optime distinguendi.

30. **Odontoplatys** Fieb.

68. (67). Augulus facialis subrectus. Antennae articulis duobus primis versus apicem sat fortiter incrassatis. Genae mediocres. Tarsi postici margine inferiore articuli primi eidem secundi aeque longo.

31. **Poecilonotus** Reut. n. gen.[1])

69 (64). Oculi basi pronoti contigui, raro tumores facettiferi limbo postico facettis destituti[2]), ipsi tumores autem pronoto contigui.

70 (71). Mas et femina difformes. Mas subelongatus, hemielytris longis, femina oblongo-obovata, hemielytris abbreviatis, fractura cunei nulla, membrana omnium brevissima solum ad marginem interiorem distinguenda. Pronotum lateribus sinuatum, maris versus apicem fortiter angustatum, feminae campanuliforme; margine basali truncato vel (♀) sinuato basin scutelli ne minime quidem obtegens. Oculi pronoto subcontigui. Antennae in quarta parte inferiore oculorum interne insertae, tenues. Tarsi postici articulo secundo primo aeque longo, tertio secundo paullo breviore. Tibiae sat longe spinulosae. Segmentum maris genitale ad sinum sinistrum muticum.

32. **Alloeonotus** Fieb.

71. (70), Mas et femina conformes. Corpus oblongo-ovale vel oblongum. Pronotum latitudine basali $^1/_4$—$^2/_5$ brevius, lateribus haud vel leviter sinuatum, basin scutelli saltem anguste obtegens. Segmentum maris genitale ad sinum sinistrum aperturae plerumque plica, tuberculo vel dente instructum.

33. **Calocoris** Fieb., Reut.

---

[1]) Typus: *P. picturatus* Reut. (= *Calocoris Hedenborgi* Reut. nec Fieb.).

[2]) Ex. gr. *Calocoris affinis, alpestris, sulphureus.*

72. (59). Pronotum strictura apicali tenui, ipsa basi articuli secundi antennarum angustiore, raro huic fere aeque lata. Caput verticale vel fortius nutans, a latere visum altitudine distincte brevius. Clypeus parum vel leviter prominens, cum fronte confluente vel ab illa impressione obtusissima discretus. Vertex saepe linea tenui longitudinali magis minusve distincte impressa. Femora subglabra vel solum pilis exsertis instructa, numquam longius pubescentia. Tibiae plerumque spinulis sat longis, interdum longissimis. Antennae longius supra apicem oculorum insertae, articulis duobus ultimis secundo vel saltem parte ejus basali vix vel haud tenuioribus, simul sumtis secundo longioribus, quarto tertio saltem $^{2}/_{5}$ breviore.

73. (76). Membrana areola majore apice angulata vel angulato-rotundata. Scutellum et hemielytra pube aurea vel argentea facile divellenda tecta. Segmentum maris genitale angulo sinistro marginis superioris spinula vel dente acuto suberecto armatum.

74. (75). Pronotum distincte transversum, strictura apicali setis erectis destituta. Scutellum parum convexum.

34. **Adelphocoris** Reut. n. gen. [1])

75. (74). Pronotum latitudine basali parum brevius, postice fortiter convexum, callis obsoletis, strictura apicali setis rigidis erectis. Scutellum convexum.

35. **Trichophoroncus** Reut. n. gen. [2])

76. (73). Membrana areola majore apice sat obtuse rotundata. Corpus superne pubescentia tomentosa destitutum. Pronotum transversum, postice fortiter convexum, strictura apicali glabra. Scutellum parte apicali convexa. Antennae in medio vel fere supra medium capitis in sinu oculorum insertae. Segmentum maris genitale ad angulum anti-

---

[1]) = *Calocoris* Fieb. pars. Typus: *Cimex seticornis* Fabr.

[2]) Typus: *Calocoris albonotatus* Jak.

cum sinus sinistri aperturae spina vel dente valido retrorsum vergente armatum.

36. **Megacoelum** Fieb.

77. (56). Vertex linea longitudinali impressa, feminae brachypterae interdum obsoleta.. Caput a latere visum altitudini aeque longum. Clypeus usque a basi fortiter prominens, verticalis. Gula horizontalis vel subhorizontalis. Genae humiles vel humillimae. Antennae fere in linea intermedia oculorum interne insertae. Femora omnia gracilia, sublinearia.

78. (79). Rostrum apicem coxarum posticarum attingens. Antennae articulis tribus ultimis aeque crassis. Pronotum marginibus lateralibus subacutis. Femina hemielytris completis, mari similis.

37. **Pantiliodes** Noualh.

79. (78). Rostrum apicem coxarum intermediarum vix superans. Pronotum marginibus lateralibus parum acutis (♂) vel obtusis (♀), feminae breviter campanuliforme, disco postico transversim strigosa. Mas et femina dissimiles, haec hemielytris abbreviatis.

38. **Ischnoscelicoris** Reut.

80. (43). Femora postica longa, compresso-dilatata, fere a basi vel saltem a medio apicem versus sensim acuminata, plerumque apicem abdominis superantia. Antennae articulo primo pronoto saltem aequelongo, rarissime hoc paullulum breviore, plerumque longius piloso vel pilis rigidis (interdum tamen facile divellendis) instructo, saepe colore variegato.

81. (84). Pronotum lateribus totis immarginatis. Membrana plerumque dense griseo-corspersa margine exteriore maculis duabus hyalinis distinctis.

82. (83). Rostrum coxas intermedias vix superans. Antennae articulo primo pronoto vix aequelongo. Pronotum margine basali late rotundato, ipso medio distincte sinuato. Femora postica apicem abdominis haud superantia. Tibiae spinulis tenuibus.

39. **Eremobiellus** Reut.

83. (82). Rostrum coxas posticas longius superans. Antennae articulo primo pronoto rarissime paullulum breviore. Tibiae posticae saltem apicem versus spinulis crassitie tibiarum saltem aeque longis, saepe multo longioribus, vel raro solum longe pilosae.

40. **Phytocoris** Fall., H. Sch.

84. (81.) Pronotum lateribus apice submarginatis. Membrana hyalina vel opalina, limbo interiore vittaque longitudinali infra apicem areolae majoris fuscis vel cinereis. Caput porrectum, a supero visum latitudini basali longitudine saltem aequale, apice acuminatum.

41. **Miridius** Fieb.

85. (42). Lorae fortiter buccato-convexae. Genae oculis altitudine aequales. Caput a latere visum altitudini brevius, clypeo cum fronte in arcum confluente. Pronotum distincte transversum, lateribus subrectis vel leviter sinuatis, disco apicem versus parum declivi. Tarsi postici articulo primo margine inferiore eodem margini secundi aeque longo. Hemielytra feminae abbreviata, cuneo distincto, membrana brevi.

42. **Horvathia** Reut.

86. (41). Genae altae, rarissime oculis paullo humiliores. Caput verticale. Vertex latus. Clypeus perpendicularis vel leviter nutans. Antennae ad vel infra apicem oculorum insertae. Pronotum sat leviter transversum, lateribus ad callos magis minusve crasse marginatis. Hemielytra feminae interdum abbreviata.

43. **Lopus** Hahn, Reut.

87. (40). Pronotum lateribus totis obtusis, callis in tylum transversum medio contrictum utrinque per latera prolongatum confluentibus, pone hunc tylum sulco latera superante instructum, disco postico elevato. Caput verticale, altitudine brevius, angulo faciali recto. Genae altae.

44. **Dionconotus** Reut.

88. (39). Vertex et frons subhorizontales, sulco medio longitudinali impresso. Pronotum lateribus acutis, antice marginatis. Angulus facialis rectus. Gula horizontalis. Rostrum apicem mesosterni paullo superans.

89. (90). Antennae longae, tenues, articulis ultimis simul sumtis secundo longioribus. Caput a latere visum altitudine longius. Frons apice breviter perpendicularis. Pedes longi. Tarsi postici articulo primo secundo sat multo breviore.

45. **Allorhinocoris** Reut.

90 (89). Antennae sat validae, articulis ultimis simul sumtis secundo duplo brevioribus, quarto tertio multo graciliore. Caput a latere visum altitudine brevius. Frons apice in lobum angulatum basin clypei obtegentem producta. Pedes breviusculi. Tarsi postici articulo primo secundo aeque longo.

46. **Pantilius** Curt.